

OČKOVACÍ KALENDÁŘ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Mimo pravidelné očkování dle zákona

| NEMOC | VĚK | | | | | | | PŘEOČKOVÁNÍ | POZNÁMKA |
|-----------------------|-----|--------------|--|------------|-----------|--------------------------|---------|---|---|
| | 0 | 1 | 5 | 10 | 18 | 25 | 50 | | |
| TETANUS | | | v rámci pravidelného očkování | | | přeočkování po 15 letech | | přeočkování po 10 letech | možnost kombinované vakcíny i proti záškrtu a černému kašli |
| ČERNÝ KAŠEL | | | v rámci pravidelného očkování | | | 1 dávka | | 1 dávka | možnost kombinované vakcíny i proti záškrtu a tetanu |
| PLANÉ NEŠTOVICE | | | | | | 2 dávky | | nestanoveno | možnost kombinované vakcíny i proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím |
| VIROVÁ HEPATITIDA A | | | | | | 2 dávky | | nestanoveno | |
| VIROVÁ HEPATITIDA B | | | v rámci pravidelného očkování od roku 1989 | | | | 3 dávky | nestanoveno | |
| KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA | | | | 3 dávky | | | | 3 dávky/přeočk. po 3 letech | první přeočkování vždy po 3 letech |
| KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA | | | | 3 dávky | | | | 3 dávky | první přeočkování vždy po 3 letech |
| HPV INFEKCE | | | | 2-3 dávky* | | | | 3 dávky | od 9 do 26 (až 45) let |
| PNEUMOKOKOVÉ NÁKAZY | | 3 + 1 dávka* | | | 1 dávka | | | 1 dávka | dle doporučení schéma 3 + 1 do 18 měsíců |
| MENINGOKOKOVÉ NÁKAZY | | 1-4 dávky | | | 1-2 dávky | | | | od 2 měs. men. C, od 3 měs. men. B, od 1 roku men. A, C, W ₁₃₅ a Y |
| ROTAVIRY | | 2-3 dávky | | | | | | | od 6 do 24 až 26 týdnů |
| CHŘÍPKA | | | | | 1 dávka | | | | od 6 měsíců |
| VZTEKLINA | | | | | 3 dávky | | | 1 dávka po 1 roce/následně vždy 1 dávka po 5 letech | |
| PÁSOVÝ OPAR | | | | | | | | 1 dávka | pro anti-VZV seropozitivní osoby |

Doporučeno všem dané věkové kategorie

Doporučeno v případě rizikových faktorů

* U vybraných věkových skupin hrazeno z veřejného ZP